

目 次

| | |
|------------------|---------------------|
| まえがき | 富永 健… i |
| 背景と展望 | 富永 健, 佐野博敏, 阪上正信… 1 |
| 1 核現象と化学 | 1 |
| 2 米国における動向 | 2 |
| 3 核現象と分析化学 | 3 |
| 参考文献 | 4 |

〈核現象と化学情報〉

| | |
|---|---------------|
| 1 粒子トラック法 | 阪上正信, 中西 孝… 7 |
| 1 まえがき | 7 |
| 2 歴史的発展 | 8 |
| 3 原理 | 9 |
| 4 元素(核種)の分布と濃度の測定 | 12 |
| 4.1 核分裂性核種の分布と濃度の測定 | 14 |
| 4.1.1 ウランの平均濃度の測定 | 14 |
| 4.1.2 ウラン分布の測定 | 18 |
| 4.1.3 トリウムの分布と濃度の測定 | 19 |
| 4.1.4 その他の核分裂性核種の | |
| 分布と濃度の測定 | 19 |
| 4.2 α トラック法による元素(核種)の分布と濃度の測定 | 21 |
| 4.2.1 α オートラジオグラフィー | 22 |
| 4.2.2 (n, α) 反応などを利用した軽元素の検出 | 23 |
| 5 中性子線量測定 | 24 |
| 6 年代測定 | 25 |
| 文 献 | 26 |
| 2 γ 線スペクトロメトリー—— <i>In situ</i> Ge(Li) 測定を中心として …小村 和久… 27 | |
| 1 はじめに | 27 |
| 2 <i>In situ</i> γ スペクトロメトリー | 28 |
| 2.1 <i>In situ</i> γ スペクトロメトリーの特徴 | 28 |
| 2.2 <i>In situ</i> γ 測定装置 | 29 |
| 2.3 測定方法 | 31 |
| 2.4 <i>In situ</i> γ スペクトルの解析 | 32 |
| 2.5 <i>In situ</i> γ スペクトロメトリーの具体例 | 34 |
| 2.5.1 フォールアウト ^{137}Cs の測定 | 34 |
| 2.5.2 核実験直後の短寿命フォールアウ | |
| トの測定 | 36 |
| 2.5.3 原子炉のスタックからの plume | 36 |
| 2.5.4 降雨の際の放射性エアロゾルの寄与 | 37 |
| 2.5.5 原爆被曝地での ^{152}Eu の検出 | 38 |
| 2.5.6 <i>In situ</i> LEPS 測定による ^{241}Am の定量 | 38 |
| 2.5.7 水試料中の ^{222}Ra の <i>In situ</i> 測定 | 38 |
| 3 <i>In situ</i> 螢光X線分析への応用 | 39 |
| 4 Ge-LEPS による低レベル放射能測定の応用 | 40 |
| 文 献 | 41 |

| | | |
|--|---|-----|
| 3 放射化分析 | 日下 譲, 平井昭司 | 43 |
| 1 特 色 | 5.1.2 マルチチャネル波高分析器 | 54 |
| 2 分析感度 | 5.1.3 データ処理 | 54 |
| 3 標準物質 | 5.2 分析例 | 54 |
| 4 サンプリングの問題点を めぐる論議 | 5.2.1 大気浮遊塵 | 55 |
| 5 INAA | 5.2.2 生体試料 | 56 |
| 5.1 γ 線スペクトロメトリー | 5.2.3 岩石試料 | 57 |
| 5.1.1 γ 線検出器 | 5.3 極短寿命核種による分析 | 59 |
| | 文 献 | 60 |
| 4 メスバウアーフ分光法 | 佐野博敏, 片田元己 | 63 |
| 1 はじめに | 2.4.1 無反跳分率と固相内ポリマー結合 | 70 |
| 2 メスバウアーフ分光法の動的 過程への応用 | 2.4.2 分子間結合の異方性と 四極分裂の非対称性 | 71 |
| 2.1 転移現象 | 3 発光メスバウアーフ分光法による 核壊変に伴う化学変化の研究 | 72 |
| 2.1.1 相 転 移 | 3.1 核壊変の化学効果の及ぶ範囲 | 73 |
| 2.1.2 磁 気 転 移 | 3.2 核壊変によるラジカルの 局所的生成 | 73 |
| 2.1.3 スピニ転移 | 3.3 壊変後の化学効果の時間変化 | 74 |
| a) 温度によるスピニ転移 | 4 内部転換電子散乱メスバウアー ¹ 分光法 (CEMS) | 74 |
| b) 圧力によるスピニ転移 | 4.1 スペクトルの形状解析 | 74 |
| 2.2 緩和現象 | 4.2 散乱電子の検出法の改良 | 75 |
| 2.2.1 常磁性緩和 | 文 献 | 76 |
| 2.2.2 超常磁性 | | |
| 2.2.3 電場勾配に遅い緩和がある系 | | |
| 2.3 電子が非局在化している系 | | |
| 2.3.1 混合原子価化合物 | | |
| 2.4 分子間結合と無反跳分率 | | |
| 5 γ-γ 摂動角相関 | 浅井吉蔵, 関沢 尚 | 81 |
| 1 はじめに | 磁場の測定 | 90 |
| 2 摂動角相関の原理 | 4.2 固体中の電場勾配の測定例 | 92 |
| 3 実験装置 | 4.3 動的な摂動の測定例 | 95 |
| 4 実際の測定例 | 文 献 | 97 |
| 4.1 反磁性イオンにおける超微細 | | |
| 6 ポジトロニウム化学 | 伊藤泰男, 遠藤和豊 | 99 |
| 1 陽電子消滅の基礎 | 1.3 陽電子消滅研究法 | 102 |
| 1.1 ポジトロン, ポジトロニウム | 1.3.1 陽電子消滅研究法 | 102 |
| 1.2 e^+ の消滅過程 | 1.3.2 角相関測定と消滅 γ 線 エネルギー測定 | 103 |
| 1.2.1 2 光子消滅 | 1.3.3 ポジトロニウム化学の諸側面 | 104 |
| 1.2.2 3 光子消滅 | 2 ポジトロニウムの形成 | 106 |
| 1.2.3 ポジトロニウムの消滅速度 | | |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 2.1 Ore モデル | 106 | 3.2.1 反磁性有機化合物との反応 | 112 |
| 2.2 スパー反応モデル | 107 | 3.2.2 反磁性無機化合物との反応 | 113 |
| 2.3 ポジトロニウム形成の問題点 | 109 | 3.2.3 常磁性無機化合物との反応 | 114 |
| 3 ポジトロニウムの反応 | 109 | 3.2.4 ベンゼン溶液中の錯体との反応 | 114 |
| 3.1 気 相 | 110 | 3.2.5 液晶およびミセル溶液 | 115 |
| 3.2 凝縮相 | 112 | 文 献 | 116 |
| 7 中間子化学 | | 富永 健, 遠藤和豊 | 119 |
| 1 はじめに | 119 | 3.1 ミュオニウムの生成 | 124 |
| 2 ミュオンスピントル法 (μ SR) | 121 | 3.2 ミュオニウムの反応 | 125 |
| 2.1 正ミュオンのスピントル法 (μ^+ SR) | 121 | 3.3 残留偏極 | 128 |
| 2.2 負ミュオンのスピントル法 (μ^- SR) | 123 | 4 中間子原子と化学効果 | 129 |
| 3 ミュオニウム化学 | 123 | 文 献 | 133 |
| 8 電子遷移による核励起 | | 音在清輝 | 135 |
| 1 ニート | 135 | 6 E1 の場合 (^{237}Np) | 140 |
| 2 原理 | 135 | a) ニートサテライト ($^{237}\text{Pu} \xrightarrow{\text{EC}} ^{237}\text{Np}$) | 140 |
| 3 有利状況 | 137 | b) γ 線照射 ($^{237}\text{Np}(\gamma, e) ^{237}\text{Np}^*$) | 140 |
| a) ニート条件 | 137 | 7 その他 | 141 |
| b) ニート確率 | 137 | a) MI($^{197}\text{Au}(e, e')$ ^{197m}Au) | 141 |
| c) 核異性体 | 137 | b) 拡張 | 141 |
| 4 実験的検証 ($^{189}\text{Os}(e, e')$ ^{189m}Os) | 137 | c) 応用 | 141 |
| 5 ^{189}Os 実験の補強 | 139 | 文 献 | 142 |
| a) $^{103}\text{Rh}(e, e')$ ^{103m}Rh | 139 | <放射性核種と核現象の応用> | |
| b) $^{189}\text{Os}(h\nu, e)$ ^{189m}Os | 139 | | |
| 9 線源としてのアイソトープの応用 | | 富永 洋 | 145 |
| 1 アイソトープ利用の分類と概観 | 145 | 3 密封線源による情報利用 | 152 |
| 2 非密封線源による情報利用 | 148 | 3.1 放射線応用計測 | 152 |
| 2.1 トレーサー利用 | 148 | 3.2 螢光X線法 | 153 |
| 2.2 イメージング | 148 | 3.3 中性子源利用 | 157 |
| 2.3 分析 | 150 | 3.3.1 アイソトープ中性子源 | 157 |
| 2.3.1 放射分析の分類 | 150 | 3.3.2 散乱・透過法 | 158 |
| 2.3.2 不足当量法 | 151 | 3.3.3 放射線放出法 | 159 |
| 2.3.3 ゼロ当量法 | 151 | (1) 即発放射線利用分析 | 159 |
| 2.3.4 放射能遊離法 | 151 | (2) 遅発放射線利用分析 | 160 |
| 2.3.5 放射免疫定量法 | 151 | 文 献 | 161 |
| (ラジオイムノアッセイ) | 152 | | |

| | | |
|-------------------------------|------------|------|
| 10 中性子ラジオグラフィー | 小林 昌敏 | …165 |
| 1 はじめに | 165 | |
| 2 中性子ラジオグラフィーの特徴 | 165 | |
| 3 中性子ラジオグラフィーの方法 | 167 | |
| 3.1 直接法 | 167 | |
| 3.2 転写法 | 169 | |
| 4 中性子ラジオグラフィーの応用 | 171 | |
| 5 中性子ラジオグラフィーの問題点 | | |
| 文 献 | | …173 |
| 11 荷電粒子励起 X 線 | 鍛治 東海 | …175 |
| 1 はじめに | 175 | |
| 2 軽イオンによる内殻電離 | 176 | |
| 3 重イオンによる内殻電離 | 177 | |
| 4 分子軌道間 X 線と準超重元素 | 178 | |
| 5 螢光収率と多重電離 | 178 | |
| 6 実験装置 | 181 | |
| 7 バックグラウンド放射線と標的試料 | | …183 |
| 8 検出感度 | | …186 |
| 9 元素分析への応用 | | …186 |
| 10 状態分析への応用 | | …189 |
| 文 献 | | …193 |
| 12 界面・表面分析への応用 | 清宮 懲・荒谷美智 | …197 |
| 1 ラジオトレーサー法 | 197 | |
| 1.1 表面現象の研究におけるラジオトレーサー法の特徴 | 197 | |
| 1.2 低エネルギー放射線の利用 | 197 | |
| 1.3 気/液および固/液界面における物質移動のその場測定 | 199 | |
| 1.4 界面領域における同位体交換と自己拡散 | 199 | |
| 1.5 反跳原子を利用した吸着の測定 | 200 | |
| 1.6 Jolting electron を利用した | | |
| 膜厚の測定 | | …201 |
| 2 加速器を使う方法 | | …203 |
| 2.1 加速装置を使う方法の概観 | | …203 |
| 2.1.1 観測対象の性質 | | …203 |
| 2.1.2 照射装置と分光装置 | | …204 |
| 2.1.3 方法の可能性と限界 | | …204 |
| 2.2 2,3 の応用例 | | …206 |
| 2.3 サイクロトロンを使う方法の特徴 | | …209 |
| 文 献 | | …211 |
| 13 考古学への応用 | 馬渕久夫, 富永 健 | …213 |
| 1 元素分析（螢光 X 線分析, 放射化分析） | 213 | |
| 1.1 土器および石器 | 213 | |
| 1.1.1 問題の設定 | 213 | |
| 1.1.2 試料の選択 | 214 | |
| 1.1.3 測定元素と分析法の選択 | 214 | |
| 1.1.4 データ処理 | 215 | |
| 1.2 ガラス | 215 | |
| 1.3 顔料 | 215 | |
| 1.4 金属製品 | 215 | |
| 1.4.1 模造品の識別 | 215 | |
| 1.4.2 製鍊技術, 経済状態の推測 | 215 | |
| 1.4.3 文化交流の確認 | | …216 |
| 1.5 紙, 布, 染織品, うるし | | …216 |
| 2 同位体比測定 | | …216 |
| 2.1 土器および石器 | | …216 |
| 2.2 ガラス | | …216 |
| 2.3 顔料 | | …217 |
| 2.4 金属製品 | | …217 |
| 3 状態分析（メスバウアー分光法） | | …218 |
| 3.1 土器および石器 | | …218 |
| 3.2 顔料 | | …220 |

| | | | |
|---|-----|---------------------------------------|-----|
| 3.3 金属器 | 222 | 文 献 | 223 |
| 14 年代測定への応用 野津 勝治 | | | |
| 1 年代測定とは | 225 | 3.2 月の変化 | 234 |
| 2 固化年代測定法 | 226 | 3.3 地球最古の地殻 | 234 |
| 2.1 Rb-Sr 法 | 226 | 4 惑星形成以前の年代測定 | 234 |
| 2.2 U, Th-Pb 法と Pb-Pb 法 | 227 | 4.1 元素の年代 | 234 |
| 2.3 フィッショントラック法 | 229 | 4.2 惑星系形成に要した時間—— 消滅核種を用いる年代 | 235 |
| 2.4 K-Ar 法と ^{40}Ar - ^{39}Ar 法 | 229 | 5 考古年代測定 | 236 |
| 2.5 Sm-Nd 法およびその他の方法 | 230 | 文 献 | 238 |
| 3 太陽系の形成、進化と年代測定 | 230 | | |
| 3.1 領石、月、地球の形成年代 | 230 | | |
| 15 地球化学と核現象 脇田 宏 | | | |
| 1 はじめに | 241 | 7 その他の国における研究 | 251 |
| 2 タシケント地震とソ連の研究 | 241 | 8 地中ガス中のラドン 濃度の測定 | 251 |
| 3 中国の研究 | 245 | 9 基礎的研究 | 252 |
| 4 ダイラタンシー理論 | 247 | 10 その他の研究 | 253 |
| 5 日本における研究 | 248 | 文 献 | 254 |
| 6 アメリカにおける研究 | 250 | | |